



Главное управление МЧС России по Кемеровской области информирует родителей:

Клещ может стать источником:

клещевого энцефалита (воспаление головного мозга);
боррелиоза (заболевание нервной и опорно-двигательной системы)
Пик активности клещей – май, июнь, активность продолжается все лето и даже осень

Осторожно, КЛЕЩИ!



Заражение клещевым энцефалитом возможно:

- при присасывании инфицированного клеща;
- при употреблении в пищу сырого молока инфицированных энцефалитом коз и коров;
- при неправильном снятии, раздавливании клеща или расчесывании места присасывания

Присасывание клеща можно предупредить если:

В лесу носить головной убор, светлую защитную одежду с резинками на запястьях, ноги должны быть полностью закрыты, брюки заправлены в носки. Обязательно использовать репелленты и акарициды в соответствии с инструкцией, проводить частые само- и взаимоосмотры.

После похода в лес обязательно осмотреть всю одежду, тело, расчесать волосы мелкой расческой.

Если присасывание произошло:

необходимо правильно удалить клеща, положить его в емкость (для лабораторного исследования на наличие вируса) и немедленно обратиться с ребенком в травмпункт МБУЗ ДГКБ № 5 (ул. Ворошилова, 21), для проведения экстренной серопротекции (для детей – бесплатно). Специфический иммуноглобулин необходимо ввести не позднее 96 часов от момента присасывания клеща.

Самая надежная защита - ВАКЦИНАЦИЯ, которая проводится круглогодично, для детей школьного возраста бесплатно по месту обучения или в детской поликлинике по месту проживания